

**АФРИЧКА КУГА СВИЊА ЈЕ
ВИРУСНА, ВЕОМА ОПАСНА
ЗАРАЗНА БОЛЕСТ
ДОМАЋИХ И ДИВЉИХ
СВИЊА!**

НЕМА ЛИЈЕЧЕЊА!

НЕМА ВАКЦИНАЦИЈЕ!

**ОБОЉЕВАЈУ СВИЊЕ
СВИХ КАТЕГОРИЈА!
УГИНУ СВЕ ОБОЉЕЛЕ
ЖИВОТИЊЕ!**

**ВИРУС АФРИЧКЕ КУГЕ
СВИЊА НЕ ПРЕДСТАВЉА
ОПАСНОСТ ЗА ЉУДЕ И
ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА!**



**У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АКС
СПРОВОДИ СЕ УБИЈАЊЕ
СВИХ СВИЊА НА ИМАЊУ!**



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Ресор за ветеринарство

АФРИЧКА КУГА СВИЊА

**ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА СВИЊА
У РАНОМ ОТКРИВАЊУ И
СПРИЈЕЧАВАЊУ ПОЈАВЉИВАЊА
АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА**



РЕСОР ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
Трг Републике Српске 1, 78000 БАЊА ЛУКА
Тел: 387 (0) 51 338-965; Факс: 387 (0) 51 338-886
E-mail: mps@mps.vladars.net
www.vladars.net
август, 2019.

АФРИЧКА КУГА СВИЊА

Афричка куга свиња је високо заразна болест домаћих и дивљих свиња. Дивље свиње се сматрају главним резервоаром вируса у Африци и другим подручјима гдје се болест ендемски појављује.

Болест се шири контактом заражених са здравим свињама, исхраном свиња помијама у којима има контаминираних остатака хране, контаминираним храном и водом, одјећом и обућом, контаминираним предметима и опремом, превозним средствима, стајњаком, лешевима угинулих и закланих животиња, глодарима, инсектима.

За ово обољење свиња не постоји специфична терапија нити имунопрофилактика.

Предузмите стриктне превентивне мјере на вашој фарми и приликом трговине заштитите ваше свиње и свиње ваших комшија.

Како се шири Афричка куга свиња ?

- контактом заражених са здравим свињама
- исхраном свиња помијама у којима има контаминираних остатака хране
- контаминираним храном, водом
- инфицираним крпељима
- одјећом и обућом
- контаминираним предметима и опремом
- превозним средствима
- стајњаком
- лешевима угинулих и закланих животиња
- глодарима и птицама
- инсектима.

Превентивне мјере?

- не хранити свиње помијама
- избјегавати пашно држање свиња
- спријечити директан контакт са дивљим свињама
- особе које су биле у контакту са дивљим свињама морају добро опрати и дезинфиковати одјећу и обућу
- обавезна пријава сваке болесне или угинуле домаће или дивље свиње надлежном ветеринару

- поставити дезбаријере на улазу и излазу у објекат гдје се држе свиње

Како препознати афричку кугу свиња?

- изненадно угинуће једне и више свиња
- губитак апетита
- потиштеност
- повишена тјелесна температура до 42°C
- крварења по кожи (најчешће по ушима, њушци, репу, ногама, стомаку и бочним странама трупа)
- крвав пролив
- побачаји
- несигурност у ходу
- отежано дисање, кашљање, повраћање

